

CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO – ADOLESCENTE

Idade	Vacina	História vacinal	Esquema/ Dose indicada	Idade máxima para início do esquema	Local de aplicação
10 a 19 anos	Hepatite B (recombinante) DOENÇAS EVITADAS: Hepatite B	Com 3 doses	Não há reforço	Sem limite de idade	—
		Com menos de 3 doses	Completar o esquema com 2ª ou 3ª dose		DD
		Não vacinado	3 doses (0, 1 e 6 meses)		
	Febre Amarela (atenuada) DOENÇAS EVITADAS: Febre amarela	Não vacinado	Dose única	Até 19 anos, 11 meses e 29 dias (calendário de adolescentes)	DE
		Com 1 ou mais doses	Realizada a partir de 5 anos de idade: não há dose adicional		
			Com 1 dose antes dos 5 anos de idade: reforço		
	HPV quadrivalente¹ (inativada): Meninas e meninos de 9 a 14 anos DOENÇAS EVITADAS: Câncer de colo de útero e câncer da região genital masculina	Com 2 doses	Não há dose adicional	1ª dose: até 14 anos, 11 meses e 29 dias 2ª dose: sem limite de idade	DD
		Com 1 dose	Completar o esquema com 2ª dose		
		Não vacinado(a)	2 doses (0 e 6 meses)		
	Dupla adulto (inativada) (toxóide) DOENÇAS EVITADAS: Difteria e Tétano	Com 3 doses de Penta/DTP/dT	Reforço, se última dose ≥ 10 anos	Sem limite de idade — aplicar 1 reforço de 10 em 10 anos (em caso de ferimentos graves, reforço em 5 anos)	DE
		Com menos de 3 doses	Completar o esquema com 2ª ou 3ª dose		
		Não vacinado	3 doses (0, 2 e 4 meses)		
	Meningocócica ACWY (inativada, conjugada) Meninas e meninos de 11 a 14 anos DOENÇAS EVITADAS: Doença invasiva causada por <i>Neisseria meningitidis</i> dos grupos A, C, W 135 e Y	—	Dose única	Até 14 anos, 11 meses e 29 dias	DE
	Tríplice viral — SCR (atenuada) DOENÇAS EVITADAS: Sarampo, Caxumba e Rubéola	Com 2 doses feitas na infância	Não há dose adicional	—	—
		Com 1 dose	2ª dose	Até 19 anos, 11 meses e 29 dias (calendário de adolescentes)	DD
Não vacinado		2 doses com intervalo de 30 dias			

Vacina Influenza: está disponível anualmente em períodos de campanha, conforme grupos recomendados pelo Ministério da Saúde.

Nota: A vacina HPV está indicada em 3 doses (esquema 0, 2 e 6) para pessoas que vivem com HIV e imunodeprimidos na faixa etária de 9 a 45 anos de idade, necessitando de prescrição médica para ser vacinado.