

# CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO – CRIANÇA

| Idade        | Vacina  | História vacinal                       | Esquema/<br>Dose indicada  | Idade máxima para início do esquema                                      | Local de aplicação |
|--------------|---|--|--|--|--------------------|
| Ao nascer    | <b>BCG</b> (bacilos atenuados)<br>DOENÇAS EVITADAS: Formas graves da Tuberculose  | —                                      | Dose única   | Até 4 anos, 11 meses e 29 dias   | DD                 |
|              | <b>Hepatite B</b> (recombinante)<br>DOENÇAS EVITADAS: Hepatite B  | —                                      | Dose inicial   | Até 30 dias de vida  | VLCD               |
| 2 meses      | <b>Pentavalente — DTP/Hep B/Hib</b> (inativada e conjugada)<br>DOENÇAS EVITADAS: Difteria, Tétano, Coqueluche, Hepatite B, Meningite e outras infecções por <i>Haemophilus influenzae b</i> | —                                      | 1ª dose  | Até 6 anos, 11 meses e 29 dias   | VLCE               |
|              | <b>Poliomielite (VIP)</b> (inativada)<br>DOENÇAS EVITADAS: Poliomielite ou Paralisia Infantil   | —                                      | 1ª dose  | Até 4 anos, 11 meses e 29 dias   | VLCD distal        |
|              | <b>Pneumocócica 10 valente</b> (inativada e conjugada)<br>DOENÇAS EVITADAS: Pneumonia, Otite, Meningite e outras doenças causadas pelo Pneumococo   | —                                      | 1ª dose  | Até 11 meses e 29 dias   | VLCD proximal      |
|              | <b>Rotavírus</b> (atenuada)<br>DOENÇAS EVITADAS: Diarreia por Rotavírus   | —                                      | 1ª dose  | Até 3 meses e 15 dias  | ORAL               |
| 3 meses      | <b>Meningocócica C</b> (inativada e conjugada)<br>DOENÇAS EVITADAS: Doença invasiva causada por <i>Neisseria meningitidis</i> do grupo C  | —                                      | 1ª dose  | Até 11 meses e 29 dias   | VLCE               |
| 4 meses      | <b>Pentavalente — DTP/Hep B/Hib</b> (inativada e conjugada)<br>DOENÇAS EVITADAS: Difteria, Tétano, Coqueluche, Hepatite B, Meningite e outras infecções por <i>Haemophilus influenzae b</i> | —                                      | 2ª dose  | Até 6 anos, 11 meses e 29 dias   | VLCE               |
|              | <b>Poliomielite (VIP)</b> (inativada)<br>DOENÇAS EVITADAS: Poliomielite ou Paralisia Infantil   | —                                      | 2ª dose  | Até 4 anos, 11 meses e 29 dias   | VLCD distal        |
|              | <b>Pneumocócica 10 valente</b> (inativada e conjugada)<br>DOENÇAS EVITADAS: Pneumonia, Otite, Meningite e outras doenças causadas pelo Pneumococo   | —                                      | 2ª dose  | Até 11 meses e 29 dias   | VLCD proximal      |
|              | <b>Rotavírus</b> (atenuada)<br>DOENÇAS EVITADAS: Diarreia por Rotavírus   | —                                      | 2ª dose  | Até 7 meses e 29 dias  | ORAL               |
| 5 meses      | <b>Meningocócica C</b> (inativada e conjugada)<br>DOENÇAS EVITADAS: Doença invasiva causada por <i>Neisseria meningitidis</i> do grupo C  | —                                      | 2ª dose  | Até 11 meses e 29 dias   | VLCE               |
| 6 meses      | <b>Pentavalente — DTP/Hep B/Hib</b> (inativada e conjugada)<br>DOENÇAS EVITADAS: Difteria, Tétano, Coqueluche, Hepatite B, Meningite e outras infecções por <i>Haemophilus influenzae b</i> | —                                      | 3ª dose  | Até 6 anos, 11 meses e 29 dias   | VLCE               |
|              | <b>Poliomielite (VIP)</b> (inativada)<br>DOENÇAS EVITADAS: Poliomielite ou Paralisia Infantil   | —                                      | 3ª dose  | Até 4 anos, 11 meses e 29 dias   | VLCD               |
|              | <b>Tríplice viral</b> (atenuada)<br>DOENÇAS EVITADAS: Sarampo, Caxumba e Rubéola  | —                                      | Dose zero (em vigência de surtos)                                | Até 11 meses e 29 dias   | DD                 |
| 9 meses      | <b>Febre Amarela</b> (atenuada)<br>DOENÇAS EVITADAS: Febre amarela  | —                                      | 1ª dose  | Até 4 anos, 11 meses e 29 dias   | DE                 |
| 12 meses     | <b>Tríplice viral</b> (atenuada)<br>DOENÇAS EVITADAS: Sarampo, Caxumba e Rubéola  | —                                      | 1ª dose  | Até 9 anos, 11 meses e 29 dias (calendário de crianças)                  | DD                 |
|              | <b>Pneumocócica 10 valente</b> (inativada e conjugada)<br>DOENÇAS EVITADAS: Pneumonia, Otite, Meningite e outras doenças causadas pelo Pneumococo   | Com 1 ou 2 doses                       | Reforço  | Até 4 anos, 11 meses e 29 dias   | VLCD               |
|              |   | Não vacinada                           | Dose única   |  |                    |
|              | <b>Meningocócica C</b> (inativada e conjugada)<br>DOENÇAS EVITADAS: <i>Neisseria meningitidis</i> do grupo C  | Com 1 ou 2 doses                       | Reforço  |  | VLCE               |
| Não vacinada |   | Dose única                             |  |  |                    |
| 15 meses     | <b>Tetra Viral</b> (atenuada)<br>DOENÇAS EVITADAS: Sarampo, Caxumba, Rubéola e Varicela   | Com 1 dose de Tríplice viral           | 2ª dose Tríplice viral + 1 dose Varicela                         | Até 4 anos, 11 meses e 29 dias   | DD                 |
|              | <b>Hepatite A</b> (inativada)<br>DOENÇAS EVITADAS: Hepatite A   | —                                      | Dose única   | VLCD   |                    |
|              | <b>Tríplice bacteriana — DTP</b> (inativada)<br>DOENÇAS EVITADAS: Difteria, Tétano e Coqueluche   | Com 3 doses de Penta                   | 1º reforço   | Até 6 anos, 11 meses e 29 dias   | VLCE               |
|              | <b>Poliomielite (VOPb)</b> (atenuada)<br>DOENÇAS EVITADAS: Poliomielite ou Paralisia Infantil   | Com 3 doses de VIP                     | 1º reforço   | Até 4 anos, 11 meses e 29 dias   | ORAL               |
| 4 anos       | <b>Tríplice bacteriana — DTP</b> (inativada)<br>DOENÇAS EVITADAS: Difteria, Tétano e Coqueluche   | Com 3 doses de Penta + 1 reforço DTP   | 2º reforço   | Até 6 anos, 11 meses e 29 dias   | DE                 |
|              | <b>Varicela</b> (atenuada)<br>DOENÇAS EVITADAS: Varicela  | Com 1 dose de Tetra viral              | 2ª dose  | Até 6 anos, 11 meses e 29 dias   | DD                 |
|              | <b>Febre Amarela</b> (atenuada)<br>DOENÇAS EVITADAS: Febre amarela  | Com 1 dose                             | Reforço  | Sem limite de idade  | DE                 |
|              |   | Não vacinada                           | 1 dose e reforço (mínimo de 30 dias de intervalo entre as doses) | Sem limite de idade para o reforço                                       |                    |
|              | <b>Poliomielite oral (VOPb)</b> (atenuada)<br>DOENÇAS EVITADAS: Poliomielite ou Paralisia Infantil  | Com 3 doses de VIP + 1 reforço VOPb    | 2º reforço   | Até 4 anos, 11 meses e 29 dias   | ORAL               |
| 9 anos       | <b>HPV quadrivalente</b> (inativada)<br>DOENÇAS EVITADAS: Câncer de colo de útero   | Não vacinada                           | 2 doses (0 e 6 meses)  | 1ª dose: até 14 anos, 11 meses e 29 dias<br>2ª dose: sem limite de idade | DD                 |
|              |   | Com 1 dose da vacina HPV quadrivalente | 2ª dose  |  |                    |

**Vacina Influenza:** está disponível anualmente em períodos de campanha, conforme grupos recomendados pelo Ministério da Saúde.

Nota: A vacina HPV está indicada em 3 doses (esquema 0, 2 e 6) para pessoas que vivem com HIV e imunodeprimidos na faixa etária de 9 a 45 anos de idade, necessitando de prescrição médica para ser vacinado.