

# CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO — GESTANTE

Vacina	História vacinal	Esquema/ Dose Indicada	Idade máxima para início do esquema	Local de aplicação
<b>dTpa tipo adulto / Dupla adulto (dT)</b> (inativadas) <b>DOENÇAS EVITADAS:</b> Difteria, Tétano (acidental, neonatal) e Coqueluche	Com 3 doses de Penta/DTP/dT/dTpa	1 reforço de dTpa adulto, em cada gestação (20 <sup>a</sup> –36 <sup>a</sup> semanas)	a. A 2 <sup>a</sup> dose ou reforço, deve ser feita, preferencialmente, até 20 dias antes do parto.  b. Agendar dose de reforço dTpa adulto, a cada nova gestação	DE
	Com menos de 3 doses de Penta/DTP/dT/dTpa	Completar o esquema com pelo menos 1 dose de dTpa adulto a partir da 20 <sup>a</sup> semana de gestação <sup>2</sup> e as demais doses com dT (Dupla adulto)		
	Não vacinada	1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> doses com dT e 3 <sup>a</sup> dose com dTpa adulto (20 <sup>a</sup> –36 <sup>a</sup> semanas), quando captada precocemente		
		1 <sup>a</sup> dose de dTpa adulto (20 <sup>a</sup> –36 <sup>a</sup> semanas) e as demais com dT, quando captada mais tardiamente		
<b>Hepatite B (recombinante)</b> <b>DOENÇAS EVITADAS:</b> Hepatite B	Com 3 doses	Não há reforço	—	—
	Com menos de 3 doses	Completar o esquema com 2 <sup>a</sup> ou 3 <sup>a</sup> dose	Sem limite de idade	DD
	Não vacinada	3 doses (0, 1 e 6 meses)		
<b>Febre Amarela (atenuada)</b> <b>DOENÇAS EVITADAS:</b> Febre amarela	Não vacinada	Não vacinar — realizar dose única SOMENTE em situação de risco epidemiológico	Durante o período gestacional	DE
	Vacinada com 1 ou + doses	Não administrar nenhuma dose — considerar vacinada		

**Vacina Influenza:** está disponível anualmente em períodos de campanha, conforme grupos recomendados pelo Ministério da Saúde.

Nota: A vacina HPV está indicada em 3 doses (esquema 0, 2 e 6) para pessoas que vivem com HIV e imunodeprimidos na faixa etária de 9 a 45 anos de idade, necessitando de prescrição médica para ser vacinado.  
 2. A dTpa adulto deve ser administrada idealmente entre a 20<sup>a</sup> e a 36<sup>a</sup> semana de gestação. Caso a gestante não tenha sido vacinada com dTpa adulto, aplicar no puerpério o mais rápido possível até 45 dias pós-parto.