

Indicadores da vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico (VIGITEL), residentes Município do Rio de Janeiro, anos 2014 - 2019.

Indicador - Fonte: VIGITEL	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
<b>% de Adultos que Referem Diagnóstico Médico de Hipertensão Arterial</b>	28,1	(25,5 - 30,8)	30,6	(27,6 - 33,6)	31,7	(29,0 - 34,5)	30,7	(28,1 - 33,3)	32,2	(28,6 - 33,8)	28,0	(25,5 - 30,6)	29,0	(25,3 - 32,7)	32,0	(27,5 - 36,4)
masculino	25,1	(20,9 - 29,3)	24,5	(19,8 - 29,1)	30,9	(26,5 - 35,3)	26,0	(22,0 - 29,7)	26,3	(22,3 - 30,2)	22,4	(18,7 - 36,0)	27,3	(21,4 - 33,2)	32,2	(24,7 - 39,6)
feminino	30,7	(27,3 - 34,1)	35,8	(32,0 - 39,6)	32,5	(29,0 - 35,9)	34,7	(31,2 - 38,2)	35,3	(31,8 - 38,8)	32,8	(29,4 - 36,2)	30,4	(25,7 - 35,1)	31,8	(26,6 - 37,0)
<b>% de Adultos com hipertensão arterial que referiram tratamento medicamentoso da doença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	87,4	(83,7 - 91,1)	87,7	(83,7 - 91,7)	-	-	-	-
masculino	-	-	-	-	-	-	-	-	82,9	(75,7 - 90,2)	87,2	(79,7 - 94,6)	-	-	-	-
feminino	-	-	-	-	-	-	-	-	90,1	(86,2 - 94,1)	88,0	(83,4 - 92,6)	-	-	-	-
<b>% de Adultos que Referem Diagnóstico Médico de Diabetes</b>	9,2	(7,6 - 10,9)	8,8	(6,9 - 10,6)	10,4	(8,7 - 12,1)	8,8	(7,5 - 10,1)	9,8	(8,2 - 11,4)	8,3	(7,1 - 9,6)	11,2	(8,9 - 13,6)	10,9	(8,6 - 13,2)
masculino	7,4	(5,0 - 9,8)	7,7	(5,0 - 10,5)	8,4	(6,1 - 10,7)	7,0	(5,3 - 8,7)	8,2	(6,2 - 10,3)	7,5	(5,6 - 9,5)	9,8	(6,7 - 13,0)	10,6	(7,1 - 14,0)
feminino	10,7	(8,5 - 13,0)	9,6	(7,2 - 12,1)	12,0	(9,6 - 14,5)	10,3	(8,3 - 12,2)	11,2	(8,8 - 13,5)	9,0	(7,4 - 10,7)	12,4	(9,0 - 15,9)	11,1	(8,1 - 14,2)
<b>% de adultos com diabetes que referiram realizar tratamento medicamentoso para a doença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	92,8	(87,7 - 98,0)	90,0	(85,5 - 94,4)	-	-	-	-
masculino	-	-	-	-	-	-	-	-	98,0	(95,7 - 100,0)	94,0	(89,1 - 99,0)	-	-	-	-
feminino	-	-	-	-	-	-	-	-	89,6	(81,6 - 97,6)	87,1	(80,5 - 93,7)	-	-	-	-
<b>% Adultos que Referem Diagnóstico Médico de Dislipidemia</b>	20,4	(18,0 - 22,8)	20,7	(18,2 - 23,1)	21,2	(19,0 - 23,5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
masculino	17,6	(13,9 - 21,3)	16,2	(12,6 - 19,9)	18,4	(14,9 - 22,0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
feminino	22,7	(19,6 - 25,8)	24,4	(21,2 - 27,6)	23,6	(20,6 - 26,6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>% de Adultos com Excesso de Peso (Índice de Massa Corporal maior ou igual 25 kg/m²)</b>	54,4	(51,2 - 57,6)	55,7	(52,4 - 59,0)	55,8	(52,7 - 58,9)	57,0	(54,0 - 60,0)	57,7	(54,6 - 60,7)	57,1	(54,0 - 60,2)	60,4	(55,7 - 65,1)	56,4	(51,0 - 61,2)
masculino	58,9	(53,8 - 64,0)	56,8	(51,3 - 62,3)	59,8	(54,9 - 64,7)	58,6	(54,0 - 63,3)	56,8	(51,8 - 61,7)	57,9	(52,9 - 63,0)	60,7	(52,9 - 68,4)	64,0	(56,4 - 71,7)
feminino	50,7	(46,7 - 54,6)	54,9	(50,9 - 58,8)	52,4	(48,4 - 56,4)	55,7	(51,7 - 59,6)	58,4	(54,6 - 62,2)	56,3	(52,5 - 60,1)	60,1	(54,4 - 65,9)	49,4	(43,1 - 55,8)
<b>% de Adultos com Obesidade (Índice de Massa Corporal maior ou igual 30 kg/m²)</b>	19,4	(16,9 - 21,9)	18,5	(15,9 - 21,1)	20,9	(18,4 - 23,5)	20,2	(17,8 - 22,6)	22,4	(19,9 - 24,9)	21,7	(19,2 - 24,2)	23,8	(19,9 - 27,6)	21,5	(17,4 - 25,5)
masculino	19,8	(15,7 - 23,9)	13,9	(10,1 - 17,6)	20,6	(16,7 - 24,6)	20,1	(16,4 - 23,9)	19,8	(16,0 - 23,6)	20,1	(16,1 - 24,1)	21,7	(15,8 - 27,6)	23,1	(15,9 - 30,3)
feminino	19,1	(16,1 - 22,2)	22,4	(18,9 - 26,0)	21,2	(17,9 - 24,5)	20,3	(17,3 - 23,4)	24,6	(21,4 - 27,9)	23,1	(19,9 - 26,3)	25,5	(20,5 - 30,5)	20,1	(15,7 - 24,5)
<b>% de Adultos que Praticam Atividade Física Suficiente no Tempo Livre (150 minutos - atividade moderada)</b>	37,6	(34,5 - 40,8)	41,0	(37,7 - 44,3)	38,9	(35,9 - 42,0)	36,9	(33,9 - 39,8)	34,8	(31,9 - 37,8)	37,8	(34,7 - 40,9)	35,6	(31,2 - 40,1)	33,3	(28,4 - 38,1)
masculino	41,8	(36,7 - 46,9)	50,8	(45,2 - 56,3)	48,6	(43,7 - 53,6)	42,2	(37,6 - 46,8)	43,7	(38,8 - 48,5)	45,5	(40,4 - 50,5)	33,8	(33,8 - 48,5)	44,0	(35,7 - 52,3)
feminino	34,1	(30,3 - 37,9)	32,8	(29,0 - 36,6)	30,8	(27,1 - 34,4)	32,4	(28,6 - 36,3)	27,4	(23,9 - 30,9)	31,4	(27,7 - 35,0)	31,0	(25,5 - 36,6)	24,2	(19,1 - 29,3)
<b>% de Adultos Fisicamente Inativos no Trabalho (não se deslocam para o trabalho ou para a escola a pé ou de bicicleta (perfazendo um mínimo de 10 minutos por trajeto ou 20 minutos por dia) e que não participam da limpeza pesada de suas casas)</b>	14,4	(12,0 - 16,8)	15,3	(12,5 - 18,2)	17,1	(14,7 - 19,5)	14,7	(12,5 - 17,0)	17,7	(15,2 - 20,3)	15,4	(13,1 - 17,6)	16,5	(12,8 - 20,2)	12,0	(8,4 - 15,5)
masculino	15,3	(11,3 - 19,3)	18,5	(13,5 - 23,6)	18,9	(15,0 - 22,8)	14,5	(11,2 - 17,9)	19,6	(15,4 - 23,8)	12,9	(9,6 - 16,2)	19,7	(13,6 - 25,8)	13,3	(6,7 - 19,9)
feminino	13,7	(10,8 - 16,5)	12,7	(9,8 - 15,5)	15,6	(12,5 - 18,7)	14,9	(11,8 - 18,0)	16,2	(13,2 - 19,1)	17,5	(14,5 - 20,5)	13,9	(9,4 - 18,3)	10,8	(7,4 - 14,3)
<b>% de Adultos com prática insuficiente de atividade física (atividade no deslocamento ou lazer com tempo &lt;150 minutos de atividade moderada ou 75 minutos de atividade de intensidade vigorosa semanal)</b>	-	-	-	-	43,8	(40,7 - 46,9)	44,5	(41,5 - 47,4)	45,8	(42,8 - 48,9)	44,8	(41,8 - 47,9)	45,2	(40,5 - 49,9)	51,7	(46,6 - 56,8)
masculino	-	-	-	-	31,1	(26,6 - 35,6)	37,1	(32,6 - 41,5)	36,6	(32,0 - 41,1)	36,6	(31,9 - 41,3)	33,3	(26,1 - 40,4)	38,2	(30,3 - 46,0)
feminino	-	-	-	-	54,5	(50,5 - 58,4)	50,7	(46,7 - 54,7)	53,6	(49,8 - 57,5)	51,8	(48,0 - 55,6)	55,2	(49,3 - 61,1)	63,1	(57,1 - 69,0)
<b>% de Adultos Fisicamente Inativos (não ter praticado qualquer atividade física no tempo livre nos últimos três meses e que não realizam esforços físicos relevantes no trabalho, não se deslocam para o trabalho ou para a escola a pé ou de bicicleta (perfazendo um mínimo de 10 minutos por trajeto ou 20 minutos por dia) e que não participam da limpeza pesada de suas casas)</b>	16,5	(14,2 - 18,8)	14,4	(12,2 - 16,6)	13,8	(11,7 - 15,8)	14,5	(12,5 - 16,4)	14,9	(12,9 - 17,0)	15,5	(13,4 - 17,6)	16,5	(12,9 - 20,1)	16,7	(13,1 - 20,3)
masculino	17,3	(13,6 - 20,9)	15,2	(11,3 - 19,1)	11,4	(8,4 - 14,5)	13,4	(10,5 - 16,3)	11,8	(9,1 - 14,5)	16,7	(13,1 - 20,4)	14,5	(9,0 - 20,1)	13,9	(9,6 - 18,3)
feminino	15,8	(12,9 - 18,7)	13,8	(11,3 - 16,3)	15,8	(13,0 - 18,5)	15,4	(12,8 - 18,0)	17,6	(14,7 - 20,5)	14,5	(12,1 - 16,8)	18,2	(13,5 - 22,8)	19,1	(13,6 - 24,5)
<b>% de Adultos que realizam prática insuficiente de atividade física no Tempo Livre (Lazer) e ou no Deslocamento (soma &lt; 150 minutos)</b>	47,9	(44,7 - 51,1)	43,7	(40,5 - 47,0)	43,8	(40,7 - 46,9)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
masculino	41,3	(36,3 - 46,3)	32,3	(27,4 - 37,2)	31,1	(26,6 - 35,6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
feminino	53,4	(49,5 - 57,4)	53,3	(49,4 - 57,3)	54,5	(50,5 - 58,4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>% de Adultos que Assistem TV por Três ou mais Horas Diárias</b>	30,6	(27,7 - 33,5)	26,0	(23,0 - 29,0)	28,6	(25,9 - 31,4)	29,8	(27,0 - 32,5)	-	-	-	-	-	-	-	-
masculino	31,5	(26,9 - 36,2)	26,3	(21,2 - 31,4)	24,9	(20,5 - 29,2)	29,3	(25,0 - 33,7)	-	-	-	-	-	-	-	-
feminino	29,8	(26,2 - 33,4)	25,7	(22,2 - 29,2)	31,8	(28,2 - 35,3)	30,1	(26,5 - 33,7)	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>% de Adultos que dependem três horas ou mais do seu tempo livre usando computador, tablet ou celular</b>	-	-	-	-	24,6	(21,6 - 27,5)	21,7	(19,0 - 24,5)	-	-	-	-	-	-	-	-
masculino	-	-	-	-	26,8	(22,1 - 31,5)	22,3	(18,1 - 26,5)	-	-	-	-	-	-	-	-
feminino	-	-	-	-	22,7	(19,0 - 26,4)	21,2	(17,6 - 24,9)	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>% de Adultos que dependem três ou mais horas do seu tempo livre assistindo à televisão ou usando computador, tablet ou celular</b>	-	-	-	-	66,3	(63,5 - 69,2)	62,8	(59,9 - 65,6)	68,6	(65,8 - 71,3)	66,3	(63,4 - 69,2)	73,3	(69,4 - 77,3)	70,1	(65,6 - 74,7)
masculino	-	-	-	-	65,6	(61,3 - 70,1)	65,1	(60,8 - 69,3)	69,3	(64,9 - 73,7)	67,5	(62,7 - 72,2)	72,0	(65,3 - 78,7)	66,0	(58,2 - 73,8)
feminino	-	-	-	-	67,0	(63,3 - 70,6)	60,9	(57,0 - 64,7)	68,0	(64,5 - 71,4)	65,4	(61,8 - 68,9)	74,5	(70,0 - 79,0)	73,6	(68,5 - 78,7)
<b>% de Adultos que Costumam Consumir Carnes com Excesso de Gordura</b>	25,8	(22,9 - 28,7)	27,2	(24,0 - 30,4)	27,7	(24,7 - 30,7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
masculino	32,8	(27,9 - 37,7)	36,3	(30,8 - 41,9)	36,4	(31,5 - 41,3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
feminino	20,0	(16,6 - 23,3)	19,5	(16,1 - 22,9)	20,4	(16,8 - 23,9)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>% de Adultos que Consomem Refrigerantes Cinco ou mais Dias por Semana (Consumo Regular)#</b>	22,8	(20,0 - 25,5)	19,6	(16,9 - 22,3)	20,1	(17,5 - 22,7)	16,2	(13,8 - 18,5)	18,3	(15,7 - 20,9)	18,6	(15,9 - 21,3)	18,9	(15,1 - 22,7)	15,2	(11,3 - 19,0)
masculino	23,5	(19,0 - 28,0)	21,4	(16,9 - 25,9)	21,4	(17,2 - 25,5)	18,8	(14,9 - 22,7)	23,7	(19,1 - 28,3)	20,8	(16,2 - 25,4)	20,6	(14,2 - 26,9)	19,0	(19,8 - 12,8)
feminino	22,1	(18,6 - 25,6)	18,2	(14,9 - 21,4)	19,1	(15,8 - 22,4)	14,0	(11,1 - 16,9)	13,7	(11,0 - 16,4)	16,7	(13,8 - 19,7)	17,5	(13,0 - 22,0)	11,3	(7,5 - 15,0)
<b>% de Adultos que Costumam Consumir Leite com Teor Integral de Gordura</b>	48,5	(45,3 - 51,7)	46,6	(43,2 - 50,0)	52,1	(49,0 - 55,2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
masculino	54,4	(49,3 - 59,5)	54,7	(49,2 - 60,1)	59,0	(54,3 - 63,7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
feminino	43,6	(39,6 - 47,5)	39,8	(35,9 - 43,7)	46,3	(42,3 - 50,3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fonte: Vigitel Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Análise em Saúde e Vigilância de Doenças não Transmissíveis.

<https://antigo.saude.gov.br/saude-de-a-z/vigitel>

# Até a pesquisa de 2008, o indicador era nomeado como % consumo refrigerante não diet e considerava apenas os refrigerantes e sucos artificiais com açúcar. A partir da pesquisa de 2009, o indicador passou a ser nomeado como % consumo regular refrigerante e considera os refrigerantes de qualquer tipo e sucos artificiais.

- não há indicador no ano selecionado.

\* N° de casos menor que 30, insuficiente para determinar estimativa com precisão aceitável. \*\* Número de casos insuficiente para determinar IC 95%.

Indicadores da vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico (VIGITEL), residentes Município do Rio de Janeiro, anos 2014 - 2019.

Indicador - Fonte: VIGITEL	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
% de Adultos que consumiram cinco ou mais grupos de alimentos ultraprocessados no dia anterior à entrevista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,9	(17,2 - 22,6)	20,6	(16,7 - 24,5)	17,8	(13,8 - 21,8)
masculino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,6	(20,0 - 29,3)	22,5	(16,4 - 28,6)	16,6	(10,5 - 22,7)
feminino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,9	(12,9 - 19,0)	19,0	(13,9 - 24,1)	18,7	(13,5 - 24,0)
% de Adultos que consumiram cinco ou mais grupos de alimentos não ou minimamente processados protetores para doenças crônicas no dia anterior à entrevista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,3	(21,9 - 26,8)	29,4	(25,2 - 33,6)	30,3	(25,7 - 34,8)
masculino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,4	(17,7 - 25,1)	30,3	(23,8 - 36,8)	25,8	(19,0 - 32,7)
feminino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,8	(23,5 - 30,0)	28,7	(23,3 - 34,1)	34,0	(28,0 - 40,0)
% de Adultos que Consumem Frutas e Hortaliças, Cinco ou mais Dias por Semana (Consumo Regular)	36,8	(33,8 - 39,8)	38,5	(35,4 - 41,7)	33,3	(30,6 - 36,1)	32,7	(30,0 - 35,4)	31,1	(28,4 - 33,7)	33,0	(30,2 - 35,7)	30,0	(26,0 - 34,0)	34,4	(29,8 - 39,0)
masculino	29,9	(25,4 - 34,5)	31,6	(26,6 - 36,6)	24,5	(20,6 - 28,5)	23,9	(20,1 - 27,7)	25,9	(21,9 - 29,9)	25,0	(21,0 - 29,1)	21,2	(15,9 - 26,5)	22,9	(16,8 - 29,0)
feminino	42,6	(38,7 - 46,4)	44,4	(40,5 - 48,3)	40,7	(37,0 - 44,5)	40,1	(36,3 - 43,9)	35,4	(31,8 - 39,0)	39,6	(36,0 - 43,3)	37,5	(31,9 - 43,0)	44,1	(37,8 - 50,3)
% de Adultos que Consumem Cinco ou mais Porções Diárias de Frutas e Hortaliças (Consumo Recomendado)	24,7	(22,1 - 27,3)	27,8	(24,9 - 30,8)	23,4	(21,0 - 25,9)	22,9	(20,4 - 25,3)	22,2	(19,8 - 24,6)	22,2	(19,9 - 24,6)	20,8	(17,2 - 24,3)	21,8	(17,9 - 25,8)
masculino	19,7	(15,7 - 23,7)	24,3	(19,5 - 29,1)	16,5	(13,1 - 20,0)	16,8	(13,4 - 20,1)	18,7	(15,3 - 22,2)	16,3	(12,9 - 19,7)	15,7	(11,0 - 20,4)	15,1	(10,2 - 20,0)
feminino	28,9	(25,4 - 32,3)	30,8	(27,3 - 34,4)	29,2	(25,8 - 32,6)	28,0	(24,5 - 31,4)	25,2	(21,8 - 28,5)	27,2	(24,0 - 30,5)	25,0	(20,0 - 30,1)	27,5	(21,7 - 33,2)
% de Adultos que Consumem Feijão Cinco ou mais Dias por Semana	68,5	(65,6 - 71,3)	67,1	(64,1 - 70,1)	69,4	(66,7 - 72,1)	67,8	(65,0 - 70,5)	-	-	66,9	(64,1 - 69,7)	64,9	(60,5 - 69,3)	66,2	(61,6 - 70,8)
masculino	74,1	(69,7 - 78,4)	76,4	(72,2 - 80,7)	74,8	(70,8 - 78,9)	76,2	(72,4 - 80,0)	-	-	71,4	(67,0 - 75,7)	70,2	(63,5 - 76,9)	71,1	(63,9 - 78,2)
feminino	63,7	(60,0 - 67,5)	59,3	(55,4 - 63,2)	64,9	(61,3 - 68,5)	60,7	(56,8 - 64,5)	-	-	63,2	(59,6 - 66,8)	60,5	(54,8 - 66,3)	62,2	(56,3 - 68,1)
% de Adultos que Consideram seu Consumo de Sal Alto ou Muito Alto	12,4	(10,3 - 14,6)	14,1	(11,7 - 16,5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
masculino	15,4	(11,6 - 19,1)	13,9	(10,1 - 17,7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
feminino	9,9	(7,5 - 12,3)	14,3	(11,1 - 17,4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% de Adultos que Consumem Alimentos Doces Cinco ou Mais Dias por Semana	17,9	(15,4 - 20,4)	23,1	(20,4 - 25,9)	20,8	(18,2 - 23,3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
masculino	15,1	(11,5 - 18,7)	19,0	(15,0 - 22,9)	18,2	(14,5 - 21,9)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
feminino	20,3	(16,9 - 23,6)	26,6	(22,9 - 30,3)	22,9	(19,4 - 26,4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% Adultos que Substituem comida (almoço ou Jantar) por Lanches sete ou mais vezes por Semana	19,7	(17,3 - 22,1)	17,4	(15,2 - 19,6)	18,1	(15,9 - 20,4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
masculino	16,9	(13,3 - 20,6)	12,0	(9,2 - 14,9)	13,4	(10,1 - 16,6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
feminino	22,0	(18,9 - 25,1)	21,9	(18,7 - 25,1)	22,1	(19,0 - 25,2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% de Adultos Fumantes	10,5	(8,5 - 12,4)	12,5	(10,1 - 14,9)	11,2	(9,1 - 13,3)	10,1	(8,2 - 12,1)	10,0	(8,0 - 12,0)	10,1	(8,2 - 12,1)	7,4	(5,2 - 9,5)	7,7	(5,2 - 10,1)
masculino	10,8	(7,6 - 14,0)	14,6	(10,5 - 18,8)	13,5	(9,8 - 17,2)	12,7	(9,3 - 16,2)	12,3	(8,7 - 15,9)	12,5	(9,0 - 16,0)	6,7	(3,6 - 9,8)	8,1	(4,1 - 12,2)
feminino	10,2	(7,8 - 12,5)	10,8	(8,1 - 13,4)	9,2	(6,8 - 11,6)	7,9	(5,9 - 10,0)	8,2	(6,1 - 10,2)	8,1	(6,0 - 10,1)	7,9	(5,1 - 10,8)	7,2	(4,4 - 10,1)
% de Adultos que Fumam 20 ou mais Cigarros por Dia	3,1	(2,0 - 4,2)	4,2	(2,6 - 5,9)	3,5	(2,2 - 7,8)	3,9	(2,6 - 5,2)	2,8	(2,0 - 3,7)	-	-	-	-	-	-
masculino	4,4	(2,2 - 6,6)	6,5	(3,3 - 9,8)	3,9	(1,8 - 6,0)	5,7	(3,1 - 8,2)	2,5	(1,3 - 3,6)	-	-	-	-	-	-
feminino	2,0	(1,1 - 2,8)	2,3	(1,0 - 3,6)	3,2	(1,6 - 4,7)	2,4	(1,3 - 3,4)	3,1	(1,9 - 4,3)	-	-	-	-	-	-
% de Adultos Fumantes Passivos no Domicílio	8,7	(6,8 - 10,7)	9,1	(7,0 - 11,3)	7,2	(5,5 - 8,9)	6,9	(5,3 - 8,5)	8,7	(6,7 - 10,7)	6,0	(4,4 - 7,5)	7,9	(5,0 - 10,7)	8,1	(4,8 - 11,4)
masculino	9,9	(6,5 - 13,4)	9,5	(5,9 - 13,2)	8,5	(5,7 - 11,3)	5,7	(3,6 - 7,7)	10,9	(7,4 - 14,4)	5,7	(3,3 - 8,1)	3,9	(1,2 - 6,7)	11,2†	(5,0 - 17,4)
feminino	7,7	(5,5 - 9,9)	8,8	(6,2 - 11,3)	6,2	(4,1 - 8,2)	8,0	(5,7 - 10,4)	6,8	(4,7 - 8,9)	6,2	(4,2 - 8,2)	11,2	(6,5 - 15,8)	5,5	(2,5 - 8,6)
% de Adultos Fumantes Passivos no Local de Trabalho	8,1	(6,2 - 10,0)	8,7	(6,3 - 11,1)	7,9	(6,1 - 9,7)	8,5	(6,7 - 10,3)	7,2	(5,4 - 9,0)	7,5	(5,7 - 9,2)	7,2	(4,6 - 9,9)	3,1	(1,5 - 4,7)
masculino	13,1	(9,6 - 16,7)	13,1	(8,5 - 17,7)	11,0	(8,0 - 14,0)	12,6	(9,3 - 15,9)	11,8	(8,4 - 15,2)	12,4	(9,0 - 15,9)	10,2	(5,8 - 14,6)	3,8††	0,9 - 6,6
feminino	3,9	(2,3 - 5,5)	5,0	(3,1 - 6,9)	5,2	(3,1 - 7,3)	5,1	(3,1 - 7,0)	3,3	(1,8 - 4,7)	3,3	(2,0 - 4,5)	4,8	(1,6 - 8,0)	2,5††	0,8 - 4,2
% de Adultos com Consumo Abusivo de Bebidas Alcoólicas (nos últimos 30 dias, em uma mesma ocasião)	18,3	(15,8 - 20,9)	20,7	(17,7 - 23,7)	21,8	(19,1 - 24,5)	19,3	(16,7 - 22,0)	19,1	(16,4 - 21,8)	22,6	(19,8 - 25,3)	21,8	(17,7 - 25,9)	19,9	(15,4 - 24,4)
masculino (cinco ou mais doses)	25,6	(21,1 - 30,1)	28,2	(22,9 - 33,6)	31,5	(26,8 - 36,1)	26,6	(22,3 - 31,0)	26,7	(22,1 - 31,4)	28,4	(23,8 - 33,1)	23,5	(16,9 - 30,1)	23,8	(16,5 - 31,2)
feminino (quatro ou mais doses)	12,2	(9,6 - 14,9)	14,4	(11,4 - 17,4)	13,7	(10,8 - 16,6)	13,2	(10,3 - 16,2)	12,7	(9,9 - 15,4)	17,6	(14,5 - 20,8)	20,4	(15,2 - 25,5)	16,6	(11,2 - 22,0)
% de Adultos que Referem Dirigir Após Consumo de qualquer quantidade de Bebida Alcoólica	3,1	(1,9 - 4,2)	3,3	(2,2 - 4,5)	4,9	(3,6 - 6,2)	4,0	(2,7 - 5,3)	2,9	(1,8 - 3,9)	3,1	(2,0 - 4,2)	1,8	(1,1 - 2,6)	3,6††	(1,0 - 6,2)
masculino	5,8	(3,5 - 8,1)	6,2	(3,8 - 8,5)	9,4	(6,7 - 12,1)	7,6	(5,0 - 10,2)	4,5	(2,5 - 6,5)	4,9	(2,8 - 7,1)	3,5	(1,9 - 5,2)	7,6††	(2,1 - 13,1)
feminino	0,8	(0,1 - 1,5)	0,9	(0,1 - 1,7)	1,1	(0,4 - 1,8)	1,0	(0,0 - 2,0)	1,5	(0,6 - 2,3)	1,6	(0,6 - 2,5)	0,4	**	0,3†††	(0,0 - 0,6)
% de Mulheres (50 a 69 anos de idade) que Realizaram Mamografia (em algum momento)	87,3	(83,3 - 91,2)	88,0	(84,1 - 91,9)	94,2	(91,6 - 96,8)	91,8	(88,8 - 94,9)	91,2	(87,8 - 94,6)	93,4	(90,9 - 95,9)	92,2	(88,0 - 96,3)	92,9	(88,5 - 97,3)
% de Mulheres (50 a 69 anos de idade) que Realizaram Mamografia (nos últimos 2 anos)	75,2	(70,1 - 80,2)	75,8	(70,8 - 80,8)	74,2	(69,1 - 79,4)	77,4	(73,1 - 81,7)	74,7	(70,3 - 79,2)	73,5	(69,0 - 78,0)	77,5	(71,4 - 83,6)	76,0	(69,6 - 82,5)
% de Mulheres (25 a 64 anos de idade) que Realizaram Exame de Citologia Oncológica para Câncer de Colo do Útero (em algum momento)	85,1	(81,4 - 88,8)	84,4	(80,3 - 88,4)	87,4	(83,5 - 91,2)	90,4	(87,3 - 93,5)	88,3	(84,6 - 92,1)	89,0	(85,6 - 92,5)	90,0	(84,8 - 95,3)	85,8	(79,0 - 92,7)
% de Mulheres (25 a 64 anos de idade) que Realizaram Exame de Citologia Oncológica para Câncer de Colo do Útero (nos últimos três anos)	80,0	(76,0 - 83,9)	76,8	(72,2 - 81,3)	82,4	(78,3 - 86,5)	84,0	(80,4 - 87,7)	82,9	(78,8 - 87,0)	83,7	(80,0 - 87,3)	84,8	(79,3 - 90,4)	79,9	(72,7 - 87,1)
% de Adultos que avaliaram seu Estado de Saúde como Ruim ou muito Ruim	4,4	(3,1 - 5,7)	5,2	(3,3 - 7,2)	4,6	(3,2 - 5,9)	3,8	(2,7 - 4,9)	6,0	(4,6 - 7,3)	4,8	(3,5 - 6,0)	5,5	(3,1 - 7,9)	6,4	(4,2 - 8,6)
masculino	3,7	(1,6 - 5,9)	3,4	(0,1 - 6,6)	1,7	(0,7 - 2,6)	2,2	(0,9 - 3,5)	4,2	(2,6 - 5,9)	3,3	(1,5 - 5,2)	3,5	**	6,7	(2,7 - 10,8)
feminino	5,0	(3,3 - 6,6)	6,8	(4,5 - 9,1)	7,0	(4,7 - 9,3)	5,2	(3,5 - 6,8)	7,4	(5,3 - 9,5)	5,9	(4,2 - 7,6)	7,2	(4,0 - 10,4)	6,1	(3,8 - 8,5)
% de Adultos que referiram diagnóstico médico de depressão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,9	(8,6 - 15,3)
masculino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,7	(5,6 - 17,9)
feminino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,1	(8,8 - 15,4)

Fonte: Vigitel Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Análise em Saúde e Vigilância de Doenças não Transmissíveis.

<https://antigo.saude.gov.br/saude-de-a-z/vigitel>

# Até a pesquisa de 2008, o indicador era nomeado como % consumo refrigerante não diet e considerava apenas os refrigerantes e sucos artificiais com açúcar. A partir da pesquisa - não há indicador no ano selecionado.

\* Nº de casos menor que 30, insuficiente para determinar estimativa com precisão aceitável.

\*\* Número de casos insuficiente para determinar IC 95%.

† Número de casos menor que 20. Estimativa deve ser utilizada com cautela, dada sua baixa precisão

†† Coeficiente de variação ≥35 e número de casos menor que 20. Estimativa deve ser utilizada com cautela, dada sua baixa precisão.

††† Coeficiente de variação ≥35 e número de casos menor que 20. Estimativa deve ser utilizada com cautela, dada sua baixa precisão.