

Indicadores da vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico (VIGITEL), residentes Município do Rio de Janeiro, anos 2006 - 2013.

Indicador - Fonte: VIGITEL	2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
% de Adultos que Referem Diagnóstico Médico de Hipertensão Arterial	24,7	(22,5 - 27,0)	27,1	(24,4-29,7)	29,5	(26,7-32,3)	28,0	(25,3-30,7)	29,2	(26,2-32,2)	29,8	(27,0 - 32,7)	29,7	(27,1 - 32,2)	28,7	(26,4 - 31,1)
masculino	21,0	(17,7 - 24,3)	22,2	(18,6-25,8)	23,4	(19,0-27,7)	23,0	(18,9-27,2)	23,6	(19,4-27,8)	23,9	(20,0 - 27,1)	25,4	(21,4 - 29,4)	25,1	(21,5 - 28,6)
feminino	27,9	(24,9 - 30,9)	31,1	(27,4-34,8)	34,6	(31,0-38,2)	32,1	(28,7-35,6)	33,9	(29,9-37,9)	34,7	(31,0 - 38,5)	33,2	(29,9 - 36,6)	31,8	(28,8 - 34,9)
% de Adultos que Referem Diagnóstico Médico de Diabetes	5,9	(4,7 - 7,1)	5,6	(4,5-6,7)	6,7	(5,5-7,9)	6,4	(5,2-7,5)	8,7	(6,8-10,6)	6,2	(5,0 - 7,5)	7,8	(6,2 - 9,4)	7,4	(6,1 - 8,7)
masculino	4,7	(3,1 - 6,3)	4,9	(3,3-6,5)	5,1	(3,3-6,8)	5,2	(3,7-6,8)	5,5	(3,5-7,5)	7,3	(5,2 - 9,5)	7,1	(4,5 - 9,7)	7,1	(5,0 - 9,1)
feminino	6,9	(5,2 - 8,5)	6,2	(4,7-7,8)	8,0	(6,4-9,7)	7,4	(5,7-9,0)	11,3	(8,3-14,4)	5,3	(3,9 - 6,7)	8,4	(6,4 - 10,4)	7,7	(6,1 - 9,2)
% Adultos que Referem Diagnóstico Médico de Dislipidemia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,7	(17,7 - 21,7)
masculino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,4	(13,4 - 19,4)
feminino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,4	(19,8 - 25,1)
% de Adultos com Sobrepeso (Índice de Massa Corporal maior ou igual a 25 e menor que 30 kg/m ²)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,0	(30,1 - 35,8)	32,8	(30,1 - 35,6)
masculino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,5	(32,8 - 42,1)	36,7	(32,3 - 41,1)
feminino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,9	(25,2 - 32,3)	29,2	(25,8 - 32,5)
% de Adultos com Excesso de Peso (Índice de Massa Corporal maior ou igual a 25 kg/m ²)	48,3	(45,3 - 51,3)	47,1	(44,0-50,2)	43,8	(40,6-46,9)	50,4	(47,0-53,8)	52,7	(49,1-56,3)	49,6	(46,0 - 53,4)	52,7	(49,6 - 55,8)	53,0	(50,1 - 55,9)
masculino	52,5	(47,8 - 57,1)	52,4	(42,7-57,5)	45,2	(40,2-50,3)	56,2	(50,7-61,7)	56,5	(50,8-62,3)	55,5	(49,4 - 61,8)	55,3	(50,4 - 60,1)	58,4	(53,9 - 62,9)
feminino	44,4	(40,6 - 48,3)	42,2	(38,5-45,9)	42,4	(38,4-46,3)	45,0	(41,1-48,8)	49,1	(44,5-53,6)	44,2	(40,0 - 48,5)	50,5	(46,6 - 54,4)	47,9	(44,2 - 51,6)
% de Adultos com Obesidade (Índice de Massa Corporal maior ou igual a 30 kg/m ²)	12,5	(10,8 - 14,3)	14,5	(12,4-16,6)	12,8	(10,8-14,8)	17,7	(14,9-20,6)	16,4	(13,8-18,9)	16,5	(14,2 - 18,10)	19,8	(17,3 - 22,2)	20,2	(17,8 - 22,5)
masculino	11,7	(9,1 - 14,4)	14,4	(11,4-17,5)	12,3	(9,1-15,6)	19,7	(14,7-24,7)	14,2	(10,7-17,7)	15,8	(12,1 - 19,5)	17,8	(14,1 - 21,5)	21,7	(17,9 - 25,5)
feminino	13,2	(10,9 - 15,6)	14,6	(11,8-17,4)	13,2	(10,9-15,5)	15,9	(13,1-18,7)	18,4	(14,7-22,1)	17,2	(14,3 - 20,2)	21,5	(18,3 - 24,8)	18,7	(15,9 - 21,6)
% de Adultos com Obesidade Mórbida (Índice de Massa Corporal maior ou igual a 40 Kg/m ²)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	(0,9 - 2,6)	1,5	(0,8 - 2,1)
masculino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	(0,1 - 2,3)	0,6	(0,0 - 1,4)
feminino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,2	(0,9 - 3,5)	2,2	(1,2 - 3,3)
% de Adultos com Sobrepeso (Índice de Massa Corporal maior ou igual a 25 e menor que 30 kg/m ² com Imputação)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,9	(30,2 - 35,6)	32,4	(29,8 - 35,0)
masculino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,7	(33,1 - 42,2)	36,8	(32,5 - 41,1)
feminino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,9	(25,7 - 32,1)	28,7	(25,7 - 31,8)
% de Adultos com Excesso de Peso (Índice de Massa Corporal maior ou igual a 25 kg/m ² com Imputação)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,4	(49,4 - 55,4)	53,1	(50,3 - 55,9)
masculino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,7	(50,0 - 59,5)	57,9	(53,5 - 62,3)
feminino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,4	(46,7 - 54,1)	49,1	(45,6 - 52,5)
% de Adultos com Obesidade (Índice de Massa Corporal maior ou igual a 30 kg/m ² com Imputação)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,5	(17,2 - 21,8)	20,7	(18,4 - 22,9)
masculino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,1	(13,5 - 20,7)	21,1	(17,4 - 24,7)
feminino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,5	(18,5 - 24,5)	20,3	(17,6 - 23,1)
% de Adultos com Obesidade Mórbida (Índice de Massa Corporal maior ou igual a 40 Kg/m ² com Imputação)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	(1,0 - 2,7)	1,9	(1,2 - 2,7)
masculino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	(0,1 - 2,2)	0,6	(0,0 - 1,3)
feminino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4	(1,2 - 3,7)	3,1	(1,8 - 4,3)
% de Idoso com Baixo Peso (Índice de Massa Corporal menor ou igual a 22 Kg/m ²)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,8	(10,2 - 17,4)	15,7	(12,5 - 19,0)
masculino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,6	(6,2 - 19,0)	13,8	(8,5 - 19,1)
feminino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,7	(10,4 - 18,9)	17,1	(13,0 - 21,2)
% de Idoso com Peso Adequado (Índice de Massa Corporal maior que 22 e menor que 27 Kg/m ²)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,3	(43,2 - 53,5)	43,6	(39,2 - 47,9)
masculino (cinco ou mais doses)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,4	(41,0 - 59,8)	50,8	(43,0 - 58,5)
feminino (quatro ou mais doses)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,2	(41,0 - 53,3)	39,0	(34,0 - 44,1)
% de Idoso com Excesso de Peso (Índice de Massa Corporal maior ou igual a 27 Kg/m ²)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,4	(30,9 - 41,9)	39,8	(35,4 - 44,1)
masculino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,4	(26,6 - 46,1)	33,4	(26,0 - 40,8)
feminino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,4	(30,0 - 42,9)	43,8	(38,5 - 49,1)
% de Idoso com Baixo Peso (Índice de Massa Corporal menor ou igual a 22kg/m ²) com Imputação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,8	(10,4 - 17,1)	16,7	(13,4 - 19,9)
masculino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,9	(6,6 - 19,2)	15,9	(10,0 - 21,7)
feminino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,2	(10,4 - 18,1)	17,2	(13,4 - 20,9)
% de Idoso com Peso Adequado (Índice de Massa Corporal maior que 22 e menor que 27 Kg/m ²) com Imputação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,3	(43,2 - 53,5)	43,6	(39,2 - 47,9)
masculino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,4	(41,0 - 59,8)	50,8	(43,0 - 58,5)
feminino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,2	(41,0 - 53,3)	39,0	(34,0 - 44,1)
% de Idoso com Excesso de Peso (Índice de Massa Corporal maior ou igual a 27 Kg/m ²) com Imputação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,9	(32,8 - 43,0)	39,8	(35,4 - 44,1)
masculino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,7	(27,2 - 46,2)	33,4	(26,0 - 40,8)
feminino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,6	(32,6 - 44,6)	43,8	(38,5 - 49,1)

Fonte: Vigitel Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Análise em Saúde e Vigilância de Doenças não Transmissíveis.

<https://antigo.saude.gov.br/saude-de-a-z/vigitel>

Até a pesquisa de 2008, o indicador era nomeado como % consumo refrigerante não diet e considerava apenas os refrigerantes e sucos artificiais com açúcar. A partir da pesquisa de 2009, o indicador passou a ser nomeado como % consumo regular refrigerante e considera os refrigerantes de qualquer tipo e sucos artificiais.

- não há indicador no ano selecionado.

* N° de casos menor que 30, insuficiente para determinar estimativa com precisão

NOTA: Para acessar os resultados de 2006 a 2010 acesse: <http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0208&id=28248785>

Indicadores da vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico (VIGITEL), residentes Município do Rio de Janeiro, anos 2006 - 2013.

Indicador - Fonte: VIGITEL	2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
% de Adultos Ex-fumantes	24,6	(22,1 - 27,2)	23,4	(20,9-25,9)	21,1	(18,8-23,4)	22,7	(20,1-25,2)	21,5	(19,1-24,0)	20,6	(18,2 - 23,1)	22,6	(20,2 - 25,0)	23,3	(21,0 - 25,6)
masculino	31,3	(27,0 - 35,7)	28,4	(24,0-32,9)	25,9	(21,8-30,1)	25,6	(21,2-30,0)	24,0	(19,8-28,3)	24,4	(20,1 - 28,8)	26,4	(22,2 - 30,5)	24,6	(20,9 - 28,3)
feminino	19,1	(16,2 - 22,0)	19,2	(16,5-21,8)	17,1	(14,7-19,5)	20,2	(17,3-23,2)	19,5	(16,7-22,2)	17,4	(14,8 - 20,1)	19,4	(16,7 - 22,1)	22,2	(19,4 - 25,0)
% de Adultos Fumantes Passivos no Domicílio	-	-	-	-	-	-	13,6	(10,9-16,3)	12,8	(9,8-15,8)	11,1	(8,8 - 13,5)	8,7	(6,9 - 10,4)	9,5	(7,7 - 11,3)
masculino	-	-	-	-	-	-	14,5	(9,5-19,4)	10,9	(5,4-16,3)	7,5	(5,2 - 9,9)	8,0	(5,3 - 10,8)	10,2	(7,2 - 13,1)
feminino	-	-	-	-	-	-	12,9	(10,2-15,6)	14,4	(11,2-17,7)	14,0	(10,5 - 17,7)	9,2	(7,0 - 11,5)	9,0	(6,8 - 11,2)
% de Adultos Fumantes Passivos no Local de Trabalho	-	-	-	-	-	-	13,3	(10,6-16,0)	12,1	(9,5-14,7)	12,5	(10,2 - 14,9)	10,1	(8,2 - 12,1)	10,0	(8,2 - 11,9)
masculino	-	-	-	-	-	-	19,3	(14,2-24,4)	17,1	(12,7-21,5)	18,4	(14,0 - 22,9)	15,6	(11,8 - 19,4)	13,3	(10,0 - 16,5)
feminino	-	-	-	-	-	-	8,3	(6,1-10,6)	7,9	(5,0-10,9)	7,5	(5,6 - 9,6)	5,6	(4,0 - 7,1)	7,3	(5,4 - 9,3)
% de Fumantes Passivos em Casa e/ou no Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,0	(15,5 - 20,4)	18,2	(15,9 - 20,5)
masculino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,7	(18,4 - 27,0)	21,7	(17,8 - 25,6)
feminino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,0	(11,5 - 16,6)	15,2	(12,5 - 17,9)
% de Adultos com Consumo Abusivo de Bebidas Alcoólicas (nos últimos 30 dias, em uma mesma ocasião)	16,7	(14,3 - 19,0)	19,2	(16,4-22,1)	20,5	(17,6-23,4)	21,0	(18,1-23,9)	18,6	(15,9-21,4)	18,2	(15,1 - 21,4)	18,9	(16,5 - 21,3)	17,8	(15,6 - 20,0)
masculino (cinco ou mais doses)	25,3	(21,0 - 29,5)	27,2	(22,4-31,9)	28,6	(23,6-33,5)	29,3	(24,1-34,5)	25,3	(20,6-30,1)	25,4	(19,6 - 31,3)	25,6	(21,5 - 29,8)	26,0	(22,0 - 30,0)
feminino (quatro ou mais doses)	9,5	(7,3 - 11,7)	12,6	(9,2-16,0)	13,7	(10,4-17,1)	14,0	(11,0-17,0)	13,1	(10,0-16,1)	12,2	(9,7 - 14,9)	13,3	(10,6 - 15,9)	11,0	(8,8 - 13,1)
% de Adultos que Costumam Dirigir Após Consumir Bebida Alcoólica Abusivamente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	(0,4 - 1,6)	1,2	(0,6 - 1,9)
masculino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,2	(0,8 - 3,5)	2,4	(1,0 - 3,9)
feminino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	(0,0 - 0,0)	0,2	(0,0 - 0,6)
% de Adultos que Referem Dirigir Após Consumo de qualquer quantidade de Bebida Alcoólica	-	-	*	*	*	*	*	*	*	*	2,6	(1,7 - 3,5)	4,6	(3,4 - 5,8)	3,4	(2,3 - 4,4)
masculino	-	-	*	*	*	*	*	*	*	*	5,0	(3,2 - 6,9)	8,9	(6,4 - 11,4)	6,5	(4,3 - 8,6)
feminino	-	-	*	*	*	*	*	*	*	0,5	(0,2 - 0,10)	1,0	(0,4 - 1,7)	0,8	(0,2 - 1,4)	
% de Adultos que Costumam Dirigir Após Consumir Bebida Alcoólica Abusivamente em Relação aos que Dirigem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	(1,0 - 4,0)	3,2	(1,5 - 5,0)
masculino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	(1,4 - 5,8)	4,0	(1,7 - 6,4)
feminino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	(0,0 - 0,0)	1,2	(0,0 - 2,8)
% de Adultos que Costumam Dirigir Após Consumir Bebida Alcoólica Abusivamente em Relação aos que Bebem Abusivamente e Dirigem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,3	(4,2 - 16,3)	12,0	(5,8 - 18,3)
masculino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,8	(5,3 - 20,3)	13,4	(6,0 - 20,9)
feminino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	(0,0 - 0,0)	6,2	(0,0 - 15,1)
% de Adultos que Costumam Dirigir Após Consumir Qualquer Quantidade de Bebida Alcoólica em Relação aos que Dirigem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,3	(7,6 - 13,0)	8,1	(5,5 - 10,6)
masculino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,9	(9,2 - 16,6)	10,2	(6,8 - 13,5)
feminino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	(1,7 - 7,5)	2,8	(0,2 - 5,3)
% de Adultos que Costumam Dirigir Após Consumir Qualquer Quantidade de Bebida Alcoólica em Relação aos que Bebem e Dirigem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,4	(16,9 - 27,9)	16,1	(11,3 - 20,9)
masculino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,4	(18,7 - 32,2)	19,0	(13,0 - 25,0)
feminino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,7	(5,0 - 20,4)	6,6	(0,7 - 12,6)
% Adultos que Referem que Foram Multados por Dirigir com Excesso de Velocidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	(2,1 - 3,9)
masculino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,2	(3,4 - 7,0)
feminino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	(0,4 - 1,9)
% Adultos que Referem que Foram Multados por Dirigir com Excesso de Velocidade na Cidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	(0,0 - 2,7)
masculino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	(1,8 - 4,6)
feminino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	(0,3 - 1,7)
% de Adultos que Referem que Foram Multados por Dirigir com Excesso de Velocidade em Rodovia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	(0,3 - 1,3)
masculino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	(0,6 - 2,7)
feminino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	(0,0 - 0,1)
% de Adultos que Referem que Foram Parados em Alguma Blitz de Trânsito na sua Cidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,5	(11,5 - 15,5)
masculino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,1	(17,4 - 24,7)
feminino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1	(5,2 - 9,1)
% de Mulheres (50 a 69 anos de idade) que Realizaram Mamografia (em algum momento)	-	-	76,0	(70,8-81,3)	80,0	(75,0-85,1)	83,1	(78,8-87,4)	77,8	(72,7-83,0)	81,3	(76,5 - 86,1)	-	-	-	-
% de Mulheres (50 a 69 anos de idade) que Realizaram Mamografia (nos últimos 2 anos)	-	-	62,7	(56,8-68,6)	64,9	(59,2-70,6)	69,3	(64,1-74,5)	60,9	(55,2-66,7)	67,2	(61,7 - 72,8)	72,0	(67,1 - 77,0)	75,2	(70,5 - 79,8)
% de Mulheres (25 a 64 anos) que Realizaram Exame de Citologia Oncológica para Câncer de Colo do Útero nos Últimos Três Anos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78,5	(74,7 - 82,4)	84,3	(81,1 - 87,5)
% de Mulheres (25 a 59 anos de idade) que Realizaram Exame de Citologia para Câncer de Colo do Útero (em algum momento)	-	-	83,8	(80,3-87,2)	84,2	(80,5-87,9)	86,6	(83,3-89,9)	85,4	(81,4-89,4)	83,5	(79,9 - 87,2)	-	-	-	-
% de Mulheres (25 a 59 anos de idade) que Realizaram Exame de Citologia para Câncer de Colo do Útero (nos últimos 3 anos)	-	-	80,5	(76,9-84,2)	79,9	(76,0-83,9)	77,8	(73,6-82,0)	78,4	(74,0-82,8)	77,8	(73,7 - 81,8)	79,0	(74,9 - 83,2)	84,7	(81,2 - 88,1)
% de Adultos que avaliaram seu Estado de Saúde como Ruim ou muito Ruim	6,5	(5,0 - 8,0)	5,6	(3,6-7,5)	4,2	(2,8-5,7)	4,8	(3,6-6,1)	4,5	(2,7-6,3)	4,4	(3,3 - 5,5)	6,3	(4,8 - 7,8)	4,8	(3,7 - 5,9)
masculino	6,4	(3,9 - 9,0)	*	*	*	*	4,2	(2,2-6,2)	*	*	2,8	(1,5 - 4,0)	4,0	(1,9 - 6,1)	3,7	(2,1 - 5,3)
feminino	6,6	(4,8 - 8,3)	7,5	(4,3-10,7)	5,8	(3,5-8,2)	5,4	(3,8-6,9)	4,2	(3,0-5,5)	5,7	(4,0 - 7,4)	8,2	(6,1 - 10,4)	5,6	(4,1 - 7,2)
% de Adultos com Plano de Saúde ou Convênio Médico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,6	(47,6 - 53,5)	52,2	(49,4 - 54,9)
masculino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,4	(43,6 - 53,1)	51,2	(46,8 - 55,7)
feminino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,4	(48,7 - 56,1)	53,0	(49,5 - 56,4)

Fonte: Vigitel Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Análise em Saúde e Vigilância de Doenças não Transmissíveis.

<https://antigo.saude.gov.br/saude-de-a-z/vigitel>

Até a pesquisa de 2008, o indicador era nomeado como % consumo refrigerante não diet e considerava apenas os refrigerantes e sucos artificiais com açúcar. A partir da pesquisa de 2009, o indicador passou a ser nomeado como % consumo regular refrigerante e considera os refrigerantes de qualquer tipo e sucos artificiais.

- não há indicador no ano selecionado.

* N° de casos menor que 30, insuficiente para determinar estimativa com precisão

NOTA: Para acessar os resultados de 2006 a 2010 acesse: <http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0208&id=28248785>