

Caso apresente alguma ferida que não cicatriza, procure uma unidade de saúde o mais rápido possível.
Evite a deformação do seu corpo!

Leishmaniose tegumentar americana

DISQUE SAÚDE
136

Ouvidoria Geral do SUS.
www.saude.gov.br

Biblioteca virtual da saúde
www.saude.gov.br/bvs



Ministério da
Saúde

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PÁTRIA EDUCADORA

Prevenção

O que é a leishmaniose tegumentar americana?

É uma doença infecciosa causada por diferentes espécies de protozoários denominadas *Leishmania*, que acomete pele e mucosas. Popularmente é conhecida como ferida brava, leish, úlcera de bauru e nariz de tapir.



Como se transmite?

É transmitida ao homem pela picada de um inseto denominado flebotômio, conhecido também como “mosquito palha”, birigui”, “cangalhinha ou “tatuquira”. O inseto se contamina após picar animais infectados.

Você sabia?

O inseto vetor da leishmaniose tegumentar americana é muito pequeno, medindo de 1 a 3 mm de comprimento. Possui o corpo revestido por pêlos de coloração clara (castanho claro ou cor de palha). É facilmente reconhecido pelo seu comportamento, ao voar em pequenos saltos e pousar com as asas entreabertas.

Desenvolve-se no solo úmido e com matéria orgânica. As fêmeas alimentam-se de sangue de animais e pessoas no finalzinho da tarde e durante a noite.

De modo geral, os flebotômios habitam ambientes silvestres, mas é possível encontrá-los também nas casas, no galinheiro, chiqueiro, amontoados de madeiras, telhas e tijolos.

Quais os principais sinais e sintomas clínicos da doença?

A doença pode levar de dois a três meses para se manifestar após a picada do inseto vetor, em geral apresenta-se uma ou mais feridas na pele que não cicatrizam. No início assemelham-se a picada de um inseto, aumentando de tamanho e profundidade até virarem feridas geralmente ovaladas ou arredondadas. Localizam-se geralmente nas partes expostas à picada do inseto (pernas, braços, mãos, rosto e pescoço).



Quando não tratada pode atingir o nariz e a boca

Ao exame podem ser observados vermelhidão e ulceração (ferida). Se não tratada, esta forma poderá causar deformações graves no corpo do paciente, tais como perda parcial ou total do nariz, lábios e pálpebras.

As principais queixas são:

- Obstrução nasal.
- Eliminação de crostas (cascas).
- Sangramento no nariz.
- Dificuldade de engolir.
- Dor ao engolir.
- Rouquidão.
- Dificuldade para respirar.
- Tosse.

A doença tem tratamento?

- A leishmaniose tegumentar americana tem tratamento para humanos. Ele é gratuito e está disponível na rede de serviços do Sistema Único de Saúde.

Como podemos prevenir a doença?

Cuidados individuais para evitar a picada do inseto transmissor

- Para as pessoas que trabalham na mata ou que fazem trilhas e passeios no ambiente silvestre, usar repelentes e camisas de manga comprida, calças compridas, meias e sapatos.
- Usar repelentes quando exposto a ambientes onde os insetos vetores possam ser encontrados.
- Evitar exposição nos horários de atividades dos insetos transmissores (crepúsculo e noite).
- Usar mosquiteiros de malha fina, bem como, telas em janelas e portas.

Cuidados com o ambiente para evitar a proliferação do inseto

- Limpeza de quintais e terrenos baldios.
- Limpeza periódica dos abrigos de animais domésticos (galinhas, porcos, cães, etc).
- Poda de árvores.
- Destino adequado de lixo orgânico (restos de frutas, folhas, fezes de animais, etc).
- Deixar os animais domésticos (galinhas, porcos, cães, etc) distantes do domicílio durante a noite.
- Evitar a construção de casas próximas às matas (faixa de segurança de 400 a 500 metros entre a casa e a mata).