


CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO – CRIANÇA



SAÚDE



Idade	Vacina	História vacinal	Esquema/ Dose indicada	Idade máxima para início do esquema	Local de aplicação
Ao nascer	BCG (atenuada) DOENÇAS EVITADAS: formas graves de tuberculose	—	Dose única	Até 4 anos, 11 meses e 29 dias	ID inserção inferior deltoide D
	Hepatite B (inativada) DOENÇA EVITADA: hepatite B	—	Dose inicial	Até 30 dias de vida	VLCD
2 meses	Pentavalente — DTP/Hep B/Hib (inativada) DOENÇAS EVITADAS: difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e infecções invasivas pelo <i>Haemophilus influenzae</i> tipo b	—	1ª dose	Até 6 anos, 11 meses e 29 dias	VLCE
	Poliomielite inativada (VIP) DOENÇA EVITADA: poliomielite ou paralisia infantil	—	1ª dose	Até 4 anos, 11 meses e 29 dias	VLCD distal
	Pneumocócica 10 valente (inativada e conjugada) DOENÇAS EVITADAS: pneumonia, otite, meningite e outras doenças causadas pelo pneumococo	—	1ª dose	Até 11 meses e 29 dias	VLCD proximal
	Rotavírus (atenuada) DOENÇA EVITADA: diarreia por rotavírus	—	1ª dose	Até 3 meses e 15 dias	ORAL
3 meses	Meningocócica C (inativada e conjugada) DOENÇA EVITADA: doença invasiva causada por <i>Neisseria meningitidis</i> do grupo C	—	1ª dose	Até 11 meses e 29 dias	VLCE
4 meses	Pentavalente — DTP/Hep B/Hib (inativada) DOENÇAS EVITADAS: difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, meningite por <i>Haemophilus influenzae</i> tipo b	—	2ª dose	Até 6 anos, 11 meses e 29 dias	VLCE
	Poliomielite inativada (VIP) DOENÇA EVITADA: poliomielite ou paralisia Infantil	—	2ª dose	Até 4 anos, 11 meses e 29 dias	VLCD distal
	Pneumocócica 10 valente (inativada e conjugada) DOENÇAS EVITADAS: pneumonia, otite, meningite e outras doenças causadas pelo pneumococo	—	2ª dose	Até 11 meses e 29 dias	VLCD proximal
	Rotavírus (atenuada) DOENÇA EVITADA: diarreia por rotavírus	—	2ª dose	Até 7 meses e 29 dias	ORAL
5 meses	Meningocócica C (inativada e conjugada) DOENÇA EVITADA: doença invasiva causada por <i>Neisseria meningitidis</i> do grupo C	—	2ª dose	Até 11 meses e 29 dias	VLCE
6 meses	Pentavalente — DTP/Hep B/Hib (inativada) DOENÇAS EVITADAS: difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, meningite e outras infecções por <i>Haemophilus influenzae</i> tipo b	—	3ª dose	Até 6 anos, 11 meses e 29 dias	VLCE
	Poliomielite inativada (VIP) DOENÇA EVITADA: poliomielite ou paralisia infantil	—	3ª dose	Até 4 anos, 11 meses e 29 dias	VLCD distal
	Tríplice viral (atenuada) DOENÇAS EVITADAS: sarampo, caxumba e rubéola	—	Dose zero (em vigência de surtos)	Até 11 meses e 29 dias	DD
	Covid-19 DOENÇA EVITADA: formas graves da covid-19	—	1ª dose	Até 4 anos, 11 meses e 29 dias	VLCD proximal
7 meses	Covid-19 DOENÇA EVITADA: formas graves da covid-19	Com 1 dose	2ª dose	Até 4 anos, 11 meses e 29 dias	VLCD
9 meses	Febre amarela (atenuada) DOENÇA EVITADA: febre amarela	—	1ª dose	Até 4 anos, 11 meses e 29 dias	DE
12 meses	Tríplice viral (atenuada) DOENÇAS EVITADAS: sarampo, caxumba e rubéola	—	1ª dose	Até 9 anos, 11 meses e 29 dias (calendário da criança)	DD
	Pneumocócica 10 valente (inativada e conjugada) DOENÇAS EVITADAS: pneumonia, otite, meningite e outras doenças causadas pelo pneumococo	Com 1 ou 2 doses	Reforço	Até 4 anos, 11 meses e 29 dias	VLCD
		Não vacinada	Dose única		
	Meningocócica C (inativada e conjugada) DOENÇA EVITADA: doença invasiva causada por <i>Neisseria meningitidis</i> do grupo C	Com 1 ou 2 doses	Reforço	Até 4 anos, 11 meses e 29 dias	VLCE
Não vacinada		Dose única			
15 meses	Tetra viral (atenuada) DOENÇAS EVITADAS: sarampo, caxumba, rubéola e varicela	Com 1 dose de Tríplice viral	2ª dose Tríplice viral + 1 dose Varicela	Até 4 anos, 11 meses e 29 dias	DD
	Hepatite A (inativada) DOENÇA EVITADA: hepatite A	—	Dose única	Até 4 anos, 11 meses e 29 dias	VLCD proximal
	Tríplice bacteriana — DTP (inativada) DOENÇAS EVITADAS: difteria, tétano e coqueluche	Com 3 doses de Penta	1º reforço	Até 6 anos, 11 meses e 29 dias	VLCE
	Poliomielite inativada (VIP) DOENÇA EVITADA: poliomielite ou paralisia Infantil	Com 3 doses de VIP	Reforço	Até 4 anos, 11 meses e 29 dias	VLCD distal
4 anos	Tríplice bacteriana — DTP (inativada) DOENÇAS EVITADAS: difteria, tétano e coqueluche	Com 3 doses de Penta + 1 reforço DTP	2º reforço	Até 6 anos, 11 meses e 29 dias	DE
	Varicela (atenuada) DOENÇA EVITADA: varicela	Com 1 dose de Tetra viral	2ª dose	Até 6 anos, 11 meses e 29 dias	DD
	Febre amarela (atenuada) DOENÇA EVITADA: febre amarela	Com 1 dose	1 reforço	Até 4 anos, 11 meses e 29 dias	DE
		Não vacinada	1 dose e 1 reforço (mínimo de 30 dias de intervalo entre as doses)		
9 anos	HPV quadrivalente (inativada) DOENÇAS EVITADAS: infecção pelo papilomavírus humano 6,11,16 e 18	Não vacinada	Dose única	Até 19 anos, 11 meses e 29 dias (calendário do adolescente)	DD

Notas: 1. Vacina HPV4 indicada para:

- Pessoas portadoras de Papilomatose Respiratória Recorrente (PRR) a partir de 2 anos de idade esquema 3 doses (0, 2, e 6 meses) e com prescrição médica (OFÍCIO CIRCULAR Nº 126/2024/SVSA/MS).
- Pessoas que vivem com HIV/Aids, pacientes oncológicos e imunodeprimidos, na faixa etária de 9 a 45 anos de idade, esquema de 3 doses (0,2 e 6 meses) necessitando de prescrição médica para ser vacinado.
- Últimas de violência sexual 9 a 14 anos esquema de 2 doses (0 e 6 meses) e de 15 a 45 anos esquema de 3 doses (0,2 e 6 meses), conforme NOTA TÉCNICA nº 63/2023 CGICI/DPNI/SVSA/MS.

- 2. Vacina Influenza (gripe):** indicação para grupos prioritários definidos pelo MS.
- 3. Vacina Covid-19:** A partir de 5 anos inclusão da vacina na estratégia conforme PNI/MS.