

# CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO – ADULTO

| Idade                        | Vacina  | História vacinal                               | Esquema/<br>Dose indicada   | Idade máxima para início do esquema  | Local de aplicação |
|------------------------------|---|--|---|--|--------------------|
| 20 anos ou mais              | <b>Hepatite B</b> (inativada)<br>DOENÇA EVITADA: hepatite B   | Com 3 doses                                    | Não há reforço  | —  | —                  |
|                              |   | Com menos de 3 doses                           | Completar o esquema com 2ª ou 3ª dose   | Sem limite de idade  | DD                 |
|                              |   | Não vacinado                                   | 3 doses (0, 1 e 6 meses)  |  |                    |
|                              | <b>Febre amarela</b> (atenuada)<br>DOENÇA EVITADA: febre amarela  | Não vacinado                                   | Dose única  | Até 59 anos, 11 meses e 29 dias (acima desta idade avaliar situação epidemiológica)                        | DE                 |
|                              |   | Com 1 ou mais doses                            | Não há dose adicional   | —  | —                  |
|                              | <b>Dupla adulto</b> (inativada)<br>DOENÇAS EVITADAS: difteria e tétano  | Com 3 doses de Penta/Hexa/DTP/dT anteriormente | Reforço, se última dose ≥ 10 anos   | Sem limite de idade — aplicar 1 reforço de 10 em 10 anos (em caso de ferimentos graves, reforço em 5 anos) | DE                 |
|                              |   | Com menos de 3 doses                           | Completar o esquema com 2ª ou 3ª dose   |  |                    |
|                              |   | Não vacinado                                   | 3 doses (0, 2 e 4 meses)  |  |                    |
|                              | <b>dTpa adulto</b> (inativada)<br>Para trabalhadores de saúde que lidem com RN, gestantes e puérperas<br>DOENÇAS EVITADAS: difteria, tétano e coqueluche                              | Com 3 doses de Penta/Hexa/DTP/dT anteriormente | Um reforço a cada 10 anos   | Sem limite de idade  | DE                 |
|                              | <b>Tríplice viral — SCR</b> (atenuada) ou <b>Dupla viral</b> (atenuada)<br>DOENÇAS EVITADAS: sarampo, caxumba e rubéola   | Com 2 doses SCR                                | Não há dose adicional   | —  | —                  |
|                              |   | Com 1 dose na infância                         | 2ª dose   | Até 29 anos, 11 meses e 29 dias  | DD                 |
|                              |   | Não vacinado                                   | 2 doses com intervalo de 30 dias  |  |                    |
| Não vacinado de 30 a 59 anos |   | Dose única                                     | Até 59 anos, 11 meses e 29 dias (para 60 anos e mais, uma dose se houver indicação de bloqueio vacinal) |  |                    |
| 60 anos ou mais              | <b>Pneumocócia 23 valente</b> (inativada) para indivíduos <b>acamados e asilados</b><br>DOENÇAS EVITADAS: pneumonias, meningites e outras doenças causadas por 23 tipos de pneumococo | 1 dose com 5 anos ou mais                      | 1 único reforço   | —  | DE                 |
|                              |   | Com 2 doses                                    | Não há dose adicional   | —  |                    |
|                              |   | Não vacinado                                   | 1ª dose   | 1 único reforço após 5 anos da 1ª dose   |                    |
|                              | <b>Covid-19</b><br>DOENÇA EVITADA: formas graves da covid-19  | Vacinado com 1 ou mais doses                   | 1 dose anual  | Sem limite de idade  | DD                 |
|                              |   | Não vacinado                                   |   |  |                    |

**Notas:** 1. **Vacina dTpa adulto:** está recomendada como reforço em profissionais de saúde e parteiras tradicionais.

\*\* Recomendação para realizar dTpa em caráter excepcional nos trabalhadores que atuam em berçários e creches, com atendimento de crianças até 4 anos de idade. NOTA TÉCNICA CONJUNTA Nº70/2024 - DPNI/SVSA/MS.

2. **Para profissionais de saúde, independentemente da idade:** administrar 2 doses de Tríplice Viral — SCR, conforme situação vacinal anterior, com intervalo mínimo de 30 dias.

3. **Vacina HPV4 indicada para:**

- Pessoas portadoras de Papilomatose Respiratória Recorrente (PRR) a partir de 2 anos de idade esquema 3 doses (0, 2 e 6 meses) e com prescrição médica (OFÍCIO CIRCULAR Nº 126/2024/SVSA/MS).
- Pessoas que vivem com HIV/Aids, pacientes oncológicos e imunodeprimidos, na faixa etária de 9 a 45 anos de idade, esquema de 3 doses (0, 2 e 6 meses) necessitando de prescrição médica para ser vacinado.
- Vítimas de violência sexual de 9 a 14 anos, esquema de 2 doses (0 e 6 meses) e de 15 a 45 anos esquema de 3 doses (0, 2 e 6 meses), conforme NOTA TÉCNICA nº 63/2023 CGICI/DPNI/SVSA/MS.
- Usuários de PrEP de 15 a 45 anos, esquema de 3 doses (0, 2 e 6 meses), necessitando de encaminhamento médico para ser vacinado, conforme NOTA TÉCNICA CONJUNTA Nº 101/2024-CGICI/DPNI/SVSA/MS.

4. **Vacina Covid-19 e Influenza (gripe):** indicação para grupos prioritários definidos pelo MS.