

# CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO – GESTANTE

Vacina	História vacinal	Esquema/ Dose Indicada	Idade máxima para início do esquema	Local de aplicação
<b>dTpa tipo adulto / Dupla adulto (dT)</b> (inativadas) <b>DOENÇAS EVITADAS:</b> difteria, tétano (acidental, neonatal) e coqueluche	Com 3 doses de Penta/Hexa/DTP/dT	1 reforço de dTpa adulto, a cada gestação (a partir da 20ª semana)	Agendar dose de reforço dTpa adulto, a cada nova gestação.	DE
	Com menos de 3 doses de Penta/Hexa/DTP/dT	Completar o esquema com pelo menos 1 dose de dTpa adulto (a partir da 20ª semana de gestação) e as demais doses com dT (Dupla adulto)		
	Não vacinada	1ª e 2ª doses com dT e 3ª dose com dTpa adulto (a partir da 20ª semana de gestação), quando captada precocemente		
		1ª dose de dTpa adulto (a partir da 20ª semana de gestação) e as demais com dT, quando captada mais tardiamente		
<b>Hepatite B</b> (inativada) <b>DOENÇA EVITADA:</b> hepatite B	Com 3 doses	Não há reforço	—	—
	Com menos de 3 doses	Completar o esquema com 2ª ou 3ª dose	Sem limite de idade	DD
	Não vacinada	3 doses (0, 1 e 6 meses)		
<b>Covid-19</b> <b>DOENÇA EVITADA:</b> formas graves da covid-19	Vacinada com 1 ou mais doses	1 dose a cada nova gestação	Sem limite de idade	DD
	Não vacinada			
<b>Febre amarela</b> (atenuada) <b>DOENÇA EVITADA:</b> febre amarela	Não vacinada	<b>Não vacinar:</b> Na impossibilidade de adiar a vacinação, como em situações de emergência epidemiológica, vigência de surtos ou epidemias, o serviço de saúde deverá avaliar a pertinência da vacinação, sendo <b>dose única</b> .	Durante o período gestacional	DE
	Vacinada com 1 ou mais doses	Não administrar nenhuma dose — considerar vacinada		

**Notas:** 1. **Vacina dTpa adulto:** deve ser administrada a partir da 20ª semana. Caso a gestante não tenha sido vacinada com dTpa adulto, aplicar no puerpério o mais precoce possível até 45 dias pós-parto.

2. **Vacina Influenza (gripe):** indicação para grupos prioritários definidos pelo MS.