

Idade	Vacina	História vacinal	Esquema/ Dose indicada	Idade máxima para início do esquema	Local de aplicação
10 a 19 anos	Hepatite B (inativada) DOENÇA EVITADA: hepatite B	Com 3 doses	Não há reforço	Sem limite de idade	—
		Com menos de 3 doses	Completar o esquema com 2ª ou 3ª dose		DD
		Não vacinado	3 doses (0, 1 e 6 meses)		
	Febre amarela (atenuada) DOENÇA EVITADA: febre amarela	Não vacinado	Dose única	Até 19 anos, 11 meses e 29 dias (calendário do adolescente)	DE
		Com 1 ou mais doses	Realizada a partir de 5 anos de idade: não há dose adicional		
			Com 1 dose antes dos 5 anos de idade: reforço		
	HPV quadrivalente (inativada) 10 a 14 rotina /15 a 19 anos resgate vacinal DOENÇAS EVITADAS: infecção pelo papilomavírus humano 6,11,16 e 18	Não vacinado	Dose única	Até 19 anos, 11 meses e 29 dias	DD
	Dupla adulto (inativada) DOENÇAS EVITADAS: difteria e tétano	Com 3 doses de Penta/Hexa/DTP/dT	Reforço, se última dose ≥ 10 anos	Sem limite de idade — aplicar 1 reforço de 10 em 10 anos (em caso de ferimentos graves, reforço em 5 anos)	DE
		Com menos de 3 doses	Completar o esquema com 2ª ou 3ª dose		
		Não vacinado	3 doses (0, 2 e 4 meses)		
	Meningócica ACWY (inativada) 11 a 14 anos DOENÇAS EVITADAS: meningites dos grupos A, C, W135 e Y	—	Dose única	Até 14 anos, 11 meses e 29 dias	DE
		Com esquema anterior de meningio C	Reforço	Até 14 anos, 11 meses e 29 dias	DE
	Tríplice viral — SCR (atenuada) DOENÇAS EVITADAS: sarampo, caxumba e rubéola	Com 2 doses feitas na infância	Não há dose adicional	—	—
		Com 1 dose	2ª dose (intervalo mínimo de 30 dias entre doses)	Até 19 anos, 11 meses e 29 dias (calendário do adolescente)	DD
		Não vacinado	2 doses (intervalo mínimo de 30 dias entre as doses)		

Notas: 1. Vacina HPV4 indicada para:

- Pessoas portadoras de Papilomatose Respiratória Recorrente (PRR) a partir de 2 anos de idade esquema 3 doses (0, 2 e 6 meses) e com prescrição médica (OFÍCIO CIRCULAR Nº 126/2024/SVSA/MS).
- Pessoas que vivem com HIV/Aids, pacientes oncológicos e imunodeprimidos, na faixa etária de 9 a 45 anos de idade, esquema de 3 doses (0, 2 e 6 meses) necessitando de prescrição médica para ser vacinado.
- Vítimas de violência sexual de 9 a 14 anos, esquema de 2 doses (0 e 6 meses) e de 15 a 45 anos esquema de 3 doses (0,2 e 6 meses), conforme NOTA TÉCNICA nº 63/2023 CGICI/DPNI/SVSA/MS.
- Usuários de PrEP de 15 a 45 anos, esquema de 3 doses (0, 2 e 6 meses), necessitando de encaminhamento médico para ser vacinado, conforme NOTA TÉCNICA CONJUNTA Nº 101/2024-CGICI/DPNI/SVSA/MS.

2. Vacina Covid-19 e Influenza (gripe): indicação para grupos prioritários definidos pelo MS.

3. Vacina Hepatite A: usuários de PrEP de 15 a 17 anos, esquema de 2 doses (0 e 6 meses), necessitando de encaminhamento médico para ser vacinado, conforme NOTA TÉCNICA CONJUNTA Nº 184/2025-DPNI/DATHI/SVSA/MS.