


CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO – GESTANTE



Saúde



Vacina	História vacinal	Esquema/ Dose Indicada	Idade máxima para início do esquema	Local de aplicação
dTpa adulto / Dupla adulto (dT) (inativadas) DOENÇAS EVITADAS: difteria, tétano (acidental, neonatal) e coqueluche	Com 3 doses de Penta/Hexa/DTP/dT	1 reforço de dTpa adulto, a cada gestação (a partir da 20ª semana)	Agendar dose de reforço dTpa adulto, a cada nova gestação.	DE
	Com menos de 3 doses de Penta/Hexa/DTP/dT	Completar o esquema com pelo menos 1 dose de dTpa adulto (a partir da 20ª semana de gestação) e as demais doses com dT (Dupla adulto)		
	Não vacinada	1ª e 2ª doses com dT e 3ª dose com dTpa adulto (a partir da 20ª semana de gestação), quando captada precocemente		
		1ª dose de dTpa adulto (a partir da 20ª semana de gestação) e as demais com dT, quando captada mais tardiamente		
Hepatite B (inativada) DOENÇA EVITADA: hepatite B	Com 3 doses	Não há reforço	—	—
	Com menos de 3 doses	Completar o esquema com 2ª ou 3ª dose	Sem limite de idade	DD
	Não vacinada	3 doses (0, 1 e 6 meses)		
Covid-19 DOENÇA EVITADA: formas graves da covid-19	Vacinada com 1 ou mais doses	Conforme PNI/MS	Sem limite de idade	DD
	Não vacinada			
Febre amarela (atenuada) DOENÇA EVITADA: febre amarela	Não vacinada	Não vacinar: Na impossibilidade de adiar a vacinação, como em situações de emergência epidemiológica, vigência de surtos ou epidemias, o serviço de saúde deverá avaliar a pertinência da vacinação, sendo dose única .	Durante o período gestacional	DE
	Vacinada com 1 ou mais doses	Não administrar nenhuma dose — considerar vacinada		
Influenza DOENÇA EVITADA: infecções pelo vírus influenza, pneumonias virais e bacterianas	Não vacinada	Administrar uma dose a cada gestação	Sem limite de idade	DD

Notas: 1. Vacina dTpa adulto: deve ser administrada a partir da 20ª semana. Caso a gestante não tenha sido vacinada com dTpa adulto, aplicar no puerpério o mais precoce possível até 45 dias pós-parto.